

les nuisibles

LE FRELON ASIATIQUE







LE FRELON

COMMENT LE RECONNAÎTRE ?

C'est un hyménoptère originaire d'Asie. Il vit en colonie autour d'une reine. Une colonie peut compter environ 1200 ouvrières et générer une dizaine de milliers d'individus sur une saison.




Échelle : 1/1



Échelle : 1/1

Son cycle biologique :



Mars – avril : sortie d'hivernage des reines et installation du pré-nid

Fin avril – juillet : développement de la colonie, développement du nid

Fin juillet – octobre : colonie et taille du nid au maximum

Fin octobre : départ des futures reines pour fécondation et hivernage, mort de la vieille reine et des ouvrières

Mi décembre : le nid se vide et se dégrade au fur et à mesure des intempéries

Pourquoi lutter contre le frelon ?

C'est un prédateur agressif pour les autres hyménoptères comme l'abeille domestique et d'autres insectes (papillons, mouches, araignées...). Espèce invasive, il se nourrit d'une multitude d'insectes riches en protéines.

Sa consommation d'abeille a des conséquences désastreuses sur les ruches et la production de miel. Son activité de prédation sur les pollinisateurs peut impacter la biodiversité locale.

Le frelon asiatique est-il dangereux pour l'homme ?

Seul, il ne représente pas un danger direct pour l'homme. Sa piqûre n'est pas plus dangereuse que celle du frelon européen. En revanche, le frelon asiatique comme tout animal sauvage, peut devenir très agressif lorsqu'il s'agit de défendre le nid ou la colonie.

Comment reconnaître un nid ?

Le nid en début de saison (avril) est relativement petit et se développe au fur et à mesure de l'avancée de la saison pour atteindre une taille parfois conséquente on parle alors de pré-nid et de nid.

La forte population de frelon sur un site ne veut pas forcément dire qu'un nid est présent. Il peut ne s'agir que d'un point de collecte de nourriture.

Le nid peut être difficilement visible. De couleur crème, il se confond dans le feuillage des arbres. Il peut aussi se trouver dans une haie, sous une toiture, dans un conduit de cheminée et même parfois dans des avaloirs d'eau pluviale. Les supports sont très variés. En début de saison, les nids sont préférentiellement installés auprès des habitations (vérandas, praux, nichoirs des oiseaux, balcons, rebords de toit, etc.)



Que faire si vous repérez un nid ?


Ne jamais décrocher un nid seul.

L'appel à un professionnel est recommandé.

Dans le cadre du Plan D'action Collectif contre le frelon asiatique organisé par POLLENIZ la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire propose une aide à hauteur de 50 % du montant de l'intervention.

Il faut contacter le service Espaces publics au 02 40 80 85 72.

Un technicien viendra constater la présence du nid. Une fiche d'intervention sera remplie et transmise à Polleniz (partenaire pour la gestion de l'enlèvement des nids) pour diligenter une intervention sous 3 à 4 jours en moyenne. Attention, si un appel direct à un prestataire pour l'enlèvement du nid est fait, la Ville ne pourra prendre en charge les 50 % de l'intervention.



29

interventions réalisées en 2019

133

interventions enregistrées
au 14 septembre 2020

40 %

des nids détruits dans le département
se trouvent dans les arbres

90 cm

de diamètre : taille que peut atteindre un nid

les nuisibles

CONTACTS

– Pour **signaler un nid**
Service ESPACES PUBLICS
Place Marcellin Verbe
espacespublics@saintsebastien.fr
02 40 80 85 72

– **Se renseigner, se tenir informé**
de votre intervention
POLLENIZ 44
02 40 36 83 03
www.polleniz.fr



www.saintsebastien.fr



Saint-Sébastien
Sud Loire